



Indice d'abondance de juvéniles de saumon (0+) en Bretagne de 1997 à 2015

Contribution à la production de juvéniles par bassin en 2015




* Nombre de cours d'eau à saumons faisant l'objet d'un TAC : **29**
 * Nombre de cours d'eau à saumons faisant l'objet d'une exploitation régulière par pêche à la ligne : **22**
 * Nombre de cours d'eau échantillonnés : **23**¹
 * Nombre de stations : **263**

¹: Les bassins du Jarlot et de l'Aber Ildut faisant l'objet d'une exploitation régulière par pêche à la ligne ne sont pas échantillonnés.



* Surface de production totale estimée en Bretagne : **3 141 807 m²** d'équivalent radier/rapide
 * Surface de production suivie : **2 746 298 m²** d'équivalent radier/rapide
 * % de surface de production échantillonné : **87,4 %**

Evolution de l'indice d'abondance pondéré en Bretagne de 1997 à 2015




Sur les 19 années, on observe une série de 5 années (1997-2001) où la moyenne est de 20,7. Depuis 2002, la moyenne régionale est relativement stable (36,4) avec quelques fluctuations interannuelles : indices relativement faibles en 2004 (25,7), 2007 (21,2) et 2008 (23,9) et de bons indices en 2005 (44,28), 2011 (53,7) et 2015 (44,87).

En 2015, la moyenne régionale est supérieure à la moyenne 2005-2015 (36,60).

10 bassins sont en forte hausse en 2015 par rapport à la moyenne 2004-2014 : Couesnon, Gouët, Léguer, Yar, Douron, Penzé, Elorn, Aulne, Odet et Ellé ; 3 bassins en hausse : Trieux, Goyen et Scorff ; 2 bassins stables : Queffleuth et Blavet ; 1 bassin en baisse : Leff et 5 bassins en très forte baisse : Jaudy, Mignonne-Camfrout-Faou, Aven, Pont du Roc'h et Kergroix

En 2015, 13 cours d'eau sur les 21 échantillonnés ont des indices supérieurs à leur moyenne interannuelle 2004-2014.

Nombre de juvéniles en Bretagne



La production moyenne régionale en 2015

- permet de distinguer :
- 1 cours d'eau important : **L'Ellé** qui représente plus de 20% du total régional
 - **6 cours d'eau intermédiaires** (entre 5 et 20 % du total régional) : Elorn, Odet-Jet-Steir, Léguer, Penzé, Scorff et Trieux
 - **6 petits cours d'eau** (entre 2 et 5% du total régional) : Blavet, Aulne, Queffleuth, Douron, Couesnon et Goyen
 - **Un ensemble de très petits cours d'eau** : Aven, Leff, Mignonne-Camfrout-Faou, Jaudy-Guindy, Gouët, Pont du Roc'h, Yar et Kergroix

A l'échelle régionale, en 2015, la production de juvéniles de saumon est en forte augmentation par rapport à la production moyenne régionale 2004-2014 (taux de variation de 25 %). La production présente toutefois des variations importantes selon les bassins.