


Indice d'abondance de juvéniles de saumon (0+) en Bretagne de 1997 à 2013

Contribution à la production de juvéniles par bassin en 2013



* Nombre de cours d'eau à saumons faisant l'objet d'un TAC : **29**
 * Nombre de cours d'eau à saumons faisant l'objet d'une exploitation régulière par pêche à la ligne : **22**
 * Nombre de cours d'eau échantillonnés : **23**¹
 * Nombre de stations : **252**

¹ : Les bassins du Jarlot et de l'Aber Ildut faisant l'objet d'une exploitation régulière par pêche à la ligne ne sont pas échantillonnés.




Pêche électrique selon la méthode des indices d'abondance de juvéniles de saumon dans le Morbihan



* Surface de production totale estimée en Bretagne : **3 141 807 m²** d'équivalent radier/rapide
 * Surface de production suivie : **2 746 298 m²** d'équivalent radier/rapide
 * % de surface de production échantillonné : **87,4 %**

Evolution de l'indice d'abondance pondéré en Bretagne de 1997 à 2013




Sur les 17 années, on observe une série de 5 années (1997-2001) où la moyenne est de 20,7. Depuis 2002, la moyenne régionale est relativement stable (35,5) avec quelques fluctuations interannuelles : indices relativement faibles en 2004 (25,7), 2007 (21,2) et 2008 (23,9) et un bon indice en 2011 (53,7).

En 2013, la moyenne régionale (36,1) est légèrement supérieure à la moyenne 2003-2013 (35,5).

4 bassins sont en baisse (Elorn, Pont du Roc'h, Goyen et Penzé), 2 bassins sont stables (Léguer et Douron), 2 bassins en hausse (Ellé et Scorff) et 5 bassins en forte hausse (Couesnon, Leff, Trieux, Gouët et Aulne); les 7 autres bassins sont en très forte baisse entre autre pour le Yar, l'Odet et le Kergroix.

En 2013, 12 cours d'eau sur les 21 échantillonnés ont des indices inférieurs à leur moyenne interannuelle 2003-2013.

Contribution à la production de juvéniles par bassin



La **production moyenne régionale** en 2013 permet de distinguer :

- 1 cours d'eau important : **L'Ellé** qui représente plus de 20% du total régional)
- 6 **cours d'eau intermédiaires** (entre 5 et 10 % du total régional) : Léguer, Trieux, Elorn, Scorff, Penzé et Odet-Jet-Steir
- 8 **petits cours d'eau** (entre 2 et 5% du total régional) : Blavet, Queffleuth, Mignonne-Camfrout-Le Faou, Leff, Couesnon, Aven, Douron et Aulne
- **Un ensemble de très petits cours d'eau** : Goyen, Jaudy-Guindy, Pont du Roc'h, Kergroix, Gouët et Yar.

A l'échelle régionale, en 2013, la production de juvéniles de saumon est stable par rapport à la production moyenne régionale 2003-2013 (taux de variation de 1,4 %). La production présente toutefois des variations importantes selon les bassins.

Auteur : Bretagne Grands Migrateurs
 Novembre 2013

