

Etat des lieux de la population de saumon et analyse des captures par les pêcheurs amateurs aux lignes sur le bassin de l'Ellé-Isole-Laïta

Les données générales sur le bassin


Le bassin de l'Ellé a pu préserver un environnement sauvage en raison d'une faible urbanisation et du caractère souvent très accidenté de ses versants. Le cours de l'Ellé présente de nombreux rapides, associés à des ruptures de pente dont la plus connue est la Roche du Diable. Le bassin de l'Ellé-Isole-Laïta est un bassin majeur pour la production de juvéniles de saumon.

- ⇒ Surface : 830 km²
- ⇒ Linéaire colonisé régulièrement par le saumon : 246 km
- ⇒ Linéaire potentiel ou historique colonisé par le saumon : 249 km



La production de tacons sur le bassin

L'abondance des populations de saumons dans les rivières bretonnes est estimée à partir de données de recrutement en juvéniles. Ces dernières sont obtenues par la méthode des indices d'abondance de juvéniles de saumons (IA SAT) (capture des juvéniles de l'année (0+) par pêche électrique et par unité d'effort en 5 mn).

- ⇒ Surface de production échantillonnée selon la méthode IA SAT : 613 321 m²
- ⇒ IA SAT 2005-2014 : 37,5
- ⇒ Production moyenne de 82 315 tacons 0+ entre 2005 et 2014
- ⇒ Contribution de 22,2 % du total régional (cours d'eau important)
- ⇒ En moyenne, la production de tacons sur le cours principal de l'Ellé représente près de 40 % de la production du bassin, et 35 % sur l'Isole.
- ⇒ Les indices d'abondances suivent les tendances de la moyenne régionale.



- ⇒ Linéaire cartographié : 256 km
- ⇒ Surface de production accessible par le saumon : 669 028 m²
- ⇒ Surface de production cartographiée : 685 861 m²



Sur le bassin Ellé-Isole, les résultats des indices d'abondance suivent exactement la moyenne régionale. La production de tacons sur ce bassin représente entre 20 et 25 % de la contribution régionale selon les années.

Etat des lieux de la population de saumon et analyse des captures par les pêcheurs amateurs aux lignes sur le bassin de l'Ellé-Isole-Laïta

Gestion de la pêche du saumon

Captures par les pêcheurs amateurs aux lignes de 1987 à 2014

Les déclarations sur ce bassin se font sur chacun des 3 sous-bassins (Ellé, Isole ou Laïta) même si le TAC est défini à l'échelle de l'ensemble du bassin. La moyenne annuelle des captures depuis 1987 à l'échelle du bassin est de 67 saumons de printemps et de 74 castillons. En moyenne 90 % des captures sont déclarées sur l'Ellé.




Le maximum de captures déclarées en une année est de 147 saumons de printemps en 2012 et de 190 castillons en 2012

Depuis 2000, la fermeture anticipée de la pêche des saumons de printemps a été déclenchée 6 fois sur l'Ellé-Isole-Laïta

Période d'ouverture de la pêche :

Saumons de printemps : du 14 mars au 31 mai

Castillons : du 1 juillet au 15 octobre



Fermetures anticipées de la pêche des PHM pour cause d'atteinte du TAC

- ⇒ 10/05/2004
- ⇒ 09/05/2006
- ⇒ 05/06/2007
- ⇒ 14/05/2008
- ⇒ 09/05/2012
- ⇒ 22/04/2015

Valeurs des TAC PHM depuis 2000 sur l'Ellé-Isole-Laïta

2000-2004 : 54 PHM
2005 : 79 PHM
2006-2012 : 91 PHM
2013-2015 : 83 PHM

TAC 2016-2017 :
120 saumons de printemps (PHM)
et 1077 castillons (1HM)